



ANTIEMÉTICOS EN ONCOLOGÍA

ANTAGONISTAS 5HT ₃	GRANISETRON	Kytril ®
	ONDANSETRON	Ondansetron EFG ®, Yatrox ®, Zofran ®, Zofran zydis ®, Setofilm ®
	PALONOSETRON (H)	Aloxi ® (h)
CORTICOIDES	DEXAMETASONA	Dexametasona EFG ®, Fortecortin ®
	METILPREDNISOLONA	Urbason ®, Solu-moderin ®
ANTIDOPAMINÉRGICOS	CLEBORIDA	Cleboril ®
	CLORPROZAMINA	Largactil ®
	DOMPERIDONA	Domperidona Gamir ®, Motilium ®
	HALOPERIDOL	Haloperidol Prodes ®, Haloperidol Esteve ®
	METOCLOPRAMIDA	Metoclopramida EFG ®, Primperan ®
BENZODIAZEPINAS	ALPRAZOLAM	Alprazolam EFG ®, Trankimazin ®
	LORAZEPAM	Orfidal ®, Placinal ®, Lorazepam EFG ®
	MIDAZOLAM	Dormicum ®
	OLANZAPINA	Olanzapina EFG ®, Zyprexa ®, Zolafren ®
NK1 (H)	APREPITANT (H)	Emend ® (H),
	FOSAPREPITANT (H)	Ivemend ® (H)
	ROLAPITANT (H)	Varuby ® (H),)
	NETUPITANT+PALONOSETRON (H)	Akynzeo ® (H),



Recomendaciones de ANTIEMÉTICOS en pacientes con:

	 QUIMIOTERAPIA	 RADIOTERAPIA
Altamente emetógena (>90%)	COMBINACIONES DE: ANTAGONISTAS 5HT ₃ ANTAGONISTAS DE NK 1 (H) DEXAMETASONA OLANZAPINA	COMBINACIONES DE: ANTAGONISTAS 5HT ₃ DEXAMETASONA
Moderadamente emetógena (30-90%)	ANTAGONISTAS 5HT ₃ ANTAGONISTAS DE NK 1 (H) DEXAMETASONA	ANTAGONISTAS 5HT ₃ DEXAMETASONA
Bajo riesgo (<30%)	ANTAGONISTAS 5HT ₃ DEXAMETASONA	ANTAGONISTAS 5HT ₃ DEXAMETASONA ANTIDOPAMINÉRGICOS

(Nk1): Antagonistas del receptor de Neurokinina 1 (H): Uso hospitalario
Fuentes: (1)<https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.4789>
(2)CIMA Centro de Información de medicamentos